

原位杂交固定液（动物）

货号：HK2004

【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
原位杂交固定液（动物）	HK2004	500ml	24个月

【产品简介】

组织病理学中，组织必须先经过及时有效的固定才能完成随后的包埋及切片。组织固定的作用在于保持组织、细胞的固有形态和结构，防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶，保存细胞内固有的物质，使细胞内蛋白质凝固，尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，还能使组织硬化，便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本，能防止疾病的扩散；保存好大体标本。最后，固定还可增强染色的作用。

本产品原位杂交固定液（动物）主要成分为 4%多聚甲醛，以 0.1 M 磷酸缓冲液为溶剂，pH 7.0-7.5@25℃，经 DEPC 处理，有效灭活溶液中的 RNase，专门用于固定需要做后续核酸原位杂交检测的样本。

【产品组成】

产品目录	主要成分	产品规格
原位杂交固定液（动物）	多聚甲醛	500ml

【储存与运输】

常温运输；阴凉干燥处保存，避免阳光直射，有效期 24 个月。

【使用方法】

新鲜取材的组织标本迅速浸没于本产品中，固定液与组织比例不小于 1:10，组织块不宜过厚，≤5 mm 最佳，固定时间一般 1-4 h/mm，或固定 24 h 即可进行后续操作，大标本可适当延长固定时间。

体外培养的细胞爬片固定 15 min 以内。

【注意事项】

1. 请在通风良好的环境下使用，并做好防护，避免吸入。
2. 取材组织厚度不要超过 5 mm，并确保固定液充足。
3. 用完后请及时拧紧瓶盖，防止有效成分挥发。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。